

Programului Național de Control al Tuberculozei
Unitatea Centrală de Coordonare
Tel. / Fax: + 40 21 337 45 87
E-mail: programtb@yahoo.com

Societatea Română de Pneumologie
Secțiunea de Tuberculoză
Tel. / Fax: + 40 21 337 44 60
E-mail: office@srp.ro

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRILEJUL ZILEI MONDIALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

Cu toate că tuberculoza este o boală ce își face simțită prezența de milenii, agentul microbian incriminat drept cauză a fost descoperit în urmă cu mai bine de 130 de ani iar chimio-antibioticele încep practic să fie utilizate de la începutul anilor '50 ai secolului trecut, tuberculoza rămâne un pericol permanent pentru populație, o problemă prioritară de sănătate publică a unui însemnat număr de țări. Deși, în timp și în lume s-au înregistrat numeroase progrese în combaterea tuberculozei, aspectele inedite de ordin medico-social pe care le generează constant boala impun o fermitate fără precedent a măsurilor de limitare, reducere și în final eliminare a acesteia.

Anual, în lume mor 1,5 milioane de oameni din cauza tuberculozei. O persoană contagioasă, care nu știe acest lucru, poate transmite infecția altor 10-15 persoane într-un an.

TB este a 7-a cauză de deces la nivel mondial, 1/3 din populația globului fiind infectată.


În 2010 s-au înregistrat 1,45 milioane de decese prin TB, echivalând cu 3800 de decese/zi.

Anual se apreciază că apar 8,8 milioane de cazuri noi, incidența globală la nivel mondial fiind de 128‰, cu cele mai multe cazuri înregistrate în Asia (59%) și Africa (26%).

Deși România s-a situat, din punctul de vedere al incidenței globale a TB, pe primele locuri în Regiunea Europa a OMS (locul 6 în anul 2009, după Kazakhstan, Republica Moldova, Georgia și Kirgizstan), ocupând chiar primul loc printre țările membre ale Uniunii Europene încă de la aderarea sa în 2007, în ultimii ani s-au înregistrat progrese importante în controlul bolii. Aceasta este, în primul rând rezultatul faptului că în România strategia DOTS recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru controlul TB are o acoperire de 100% din anul 2005.

Astfel, incidența globală (IG) a TB (cazurii noi și recidive) a scăzut în ultimii 10 ani cu 43% de la un maximum de 142,2‰ în anul 2002, la 82,6‰ în anul 2011 și 79‰ în anul 2012.

Incidența globală a TB în România 1985–2012



Scădere: incidența globală = 44%, a cazurilor noi = 46%, a recidivelor = 33%
(2011 populație provizorie, 2012 date și populație provizorii)

În vederea creșterii controlului TB și în conformitate cu Strategia de țară preconizată pentru perioada 2013-2017, se urmărește a se acorda prioritate următoarelor măsuri din Programul Național de Control al Tuberculozei realizat sub coordonarea Ministerului Sănătății:

- Introducerea progresivă într-un număr limitat de laboratoare performante, a tehnicilor moleculare rapide capabilă a depista în timp mai scurt TB și chimiorezistențele
- Procurarea prin procedură de achiziție centralizată a medicamentelor anti-tuberculoase
- Măsuri riguroase de reducere a transmiterii infecției tuberculoase în rândul populației generale
- O mai bună integrare a copiilor în practici standard de control al tuberculozei

- Perfecționarea continuă a sistemului standardizat de înregistrare și raportare implementat și bazat pe analiza de cohortă trimestrială

- Creșterea implicării tuturor furnizorilor de servicii medicale în controlul TB (neguvernamentale și private), cu asigurarea aderenței acestora la standardele oficiale de asistență a tuberculozei


- Încurajarea pacienților cu TB și a comunităților în scopul combaterii bolii tuberculoase

- Facilitarea și promovarea cercetării în domeniul tratamentului, diagnosticului și profilaxiei tuberculozei cu impact asupra performanțelor PNCT.

În ceea ce privește numărul de cazuri noi și recidive înregistrate anual și acesta a scăzut cu 13.290 de la 30.984 în 2002 la 17.694 în 2012.


În concordanță cu tendința favorabilă a endemiei TB din țara noastră din perioada ultimilor ani, incidența TB la copiii între 0 și 14 ani a scăzut în mod semnificativ, de la 48,2‰ în anul 2002 (1843 cazuri) la 23,8‰ în anul 2011 (770 cazuri).

Evoluția incidenței TB la copii în România între 1995-2011



Mortalitatea a scăzut de la 10,8‰ în anul 2002 la 6‰ în anul 2011. Așa acum se vede din dinamica indicatorilor sus-menționați, tuberculoza cu germeni sensibili are un trend descendent la noi în țară.

Mortalitatea prin TB în România 1985-2011




Scăderea mortalității cu 49% între 2002 și 2011 (2011 – populație provizorie)

Rata de succes terapeutic la cazurile sursă (microscopic pozitive) se menține constant peste 82% în ultimii ani.

O problemă de importanță epidemiologică majoră o reprezintă extinderea TB chimiorezistente în SUA și Europa ceea ce a condus la concentrarea atenției internaționale asupra problemei acestei forme de TB. TB chimiorezistentă pune serioase obstacole în controlul TB în lume. Tulpinile chimiorezistente sunt la fel de contagioase ca și cele sensibile.

TB cu tulpini sensibile se poate vindeca în procent de peste 95%, dar cea cu tulpini rezistente la Isoniazidă sau Rifampicină are șanse de vindecare sub 56%.

Numărul cazurilor MDR-TB notificate 2008 - 2011



În România, datele rezultând din notificarea cazurilor MDR din anii 2008 și 2011 atestă o tendință de scădere a acestora.

Avem plăcerea a vă invita să participați la festivitatea consacrată "Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei", ce va avea loc în ziua de 22 Martie 2013, orele 11 în Amfiteatrul "Constantin Anastasatu" din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta".

Dr. Georgeta Gilda Popescu

Prof. Dr. Constantin Marica

Coordonator tehnic național al
de Control al Tuberculozei

Președintele Secțiunii de Tuberculoză Programului Național
a SRP